

North Carolina Women's Hospital

Información sobre la leche humana de donante: Tratamiento de hipoglucemia

Donor Human Milk Fact Sheet: Treatment of Hypoglycemia

A su bebé se le harán pruebas de azúcar en la sangre varias veces después de haber comido. Si el nivel de azúcar en la sangre de su bebé está bajo, le daremos toda la leche materna suya que tengamos disponible. Nosotros animamos y apoyamos a todas las madres a amamantar y dar su propia leche a sus bebés.

Algunas veces, también necesitamos darle leche adicional para subir el azúcar en la sangre del bebé. Si su bebé necesita leche adicional, podemos darle la opción de usar leche humana de donante. Queremos proporcionarle información sobre la leche de donante ya que se asemeja más a su leche que cualquier otra fórmula disponible. **Si usted desea que su bebé reciba leche de donante (en caso de que se necesite leche adicional) favor de avisarle a su enfermera.**

La leche humana de donante:

- Viene de madres que están amamantando o extrayendo la leche con una bomba para su propio bebé y tienen leche adicional para dar.
- Proviene de madres a quienes se les hizo el mismo tipo de pruebas de sangre que a los donantes de sangre.
- Se procesa en el banco de leche, donde se pasteuriza (se calienta a altas temperaturas), se analiza para detectar bacterias y se congela de nuevo.

¿Por qué usar leche de donante?

- Sabemos que la leche materna proporciona la mejor nutrición y beneficios para la salud de los recién nacidos.
- Cuando su leche no está disponible, queremos darle a su bebé el alimento que más se aproxime a su propia leche.
- La leche de donante, al igual que su propia leche, es fácil de digerir y no aumenta el riesgo de infecciones ni alergias para su bebé.

¿Por cuánto tiempo se usará la leche de donante?

Normalmente solo necesitamos usar la leche adicional para algunas comidas. El hecho de que su bebé necesite leche adicional por tener bajo nivel de azúcar en la sangre **no significa** que usted no tenga suficiente leche para amamantarlo. Una vez que se estabilice el azúcar en la sangre de su bebé, usted continuará amamantándolo sin darle leche adicional.

Translated by UNC Health Care Interpreter Services, 04/27/15

Approved by NC Women's Hospital Patient Education Committee on 1/17/12, revised 12/2014